

Blaine County

Risk level: Minimal

Blaine County's positivity rate is in the moderate risk category. The case rate is in the minimal risk level and fairly steady. At-home tests are not recorded in this data. It is possible the case rate is higher than data shows.

The overall impact on local healthcare is in the moderate risk category, but the contributing factors are not COVID-related.

Taking all major factors into account, the overall determined risk level is minimal.



Using data from October 23rd to November 5th.

For questions call 208-788-5508

6.0%

Positive Rate for Blaine County

Provided by Idaho Health and Welfare

0.03

Average New Cases Per 10,000 Residents

Based on a 14-day average.

Moderate

Hospital Capacity

Impact on the local hospital is moderate because of limited staffing and capacity. Impact on the regional hospital is critical for non-COVID related care. Overall impact is moderate.

Minimal


Other Epidemiological Factors

Minimal impact to community. Investigations and contact tracing have been suspended.

RISK LEVEL	METRICS MONITORED	MITIGATION STRATEGIES
<p>MINIMAL</p> <p>MINIMAL RISK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NEW DAILY CASES <1 PER 10,000 POPULATION (14 DAY ROLLING AVERAGE) 2. COVID-19 TESTING POSITIVE RATE <5% 3. HOSPITAL CAPACITY FOR CARE IS NORMAL <p>Click for the COVID-19 Regional Risk Level Plan</p>	<p>At the minimal level, the risk of community-wide COVID-19 spread is lower.</p> <p>REGARDLESS OF THE RISK LEVEL THROUGHOUT THE PANDEMIC, EVERYONE IS ENCOURAGED TO DO THE FOLLOWING:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stay home if you are sick • Get vaccinated • If unvaccinated, maintain physical distance of at least 6 feet from others (outside of immediate family) whenever possible • If unvaccinated, avoid crowds and poorly ventilated indoor spaces • If unvaccinated, wear a mask in public (especially indoors) that fully cover the nose and mouth when physical distancing is not possible or is difficult to maintain • Wash hands frequently for at least 20 seconds or use hand sanitizer if soap and water aren't available • Vulnerable populations (older adults, individuals with underlying health conditions) take extra precautions • Carefully monitor your health – be alert for symptoms

WHAT TO KNOW ABOUT SCPHD'S COVID-19 RISK LEVELS:

- The risk levels may be applied at the county level.
- **Different counties within SCPHD may be at different risk levels.** Risk levels can increase or decrease.
- In ALL risk levels, the preventive measures outlined in the Minimal Risk Level should be followed. *Always prepare for the next risk level.*
- In addition to metrics determining risk of transmission, public health officials will closely monitor and may take into consideration for movement to a different risk level the following:
 - Input from hospital partners – local hospital capacity is determined by each hospital in the region
 - Trends in COVID-19 testing, including positivity rate
 - Supplies of Personal Protective Equipment (PPE) for healthcare providers/first responders
 - Epidemiological investigation and contact tracing capacity, including outbreaks associated with congregate living facilities
 - COVID-related hospitalizations and deaths
 - Syndromic surveillance of emergency department visits with COVID-like symptoms



Condado de Blaine

nivel de riesgo: Moderado

La tasa de positividad del condado de Blaine está en la categoría de riesgo moderado. La tasa de casos se encuentra en el nivel de riesgo mínimo y es bastante estable. Las pruebas en el hogar no se registran en estos datos. Es posible que la tasa de casos sea más alta de lo que muestran los datos.

El impacto general en la atención médica local se encuentra en la categoría de riesgo moderado, pero los factores contribuyentes no están relacionados con COVID. Teniendo en cuenta todos los factores principales, el nivel de riesgo general determinado es mínimo.



Usando datos del 23 octubre al 5 de noviembre

Para preguntas llame al 208-788-5508

6.0%

Clasificado positiva para el condado de Blaine

proporcionada por Idaho Health and Welfare

0.03

Promedio de casos nuevos por cada 10,000 residents

Basado en un promedio de 14 días.

Moderado

La Capacidad del hospital

El impacto en el hospital local es moderado debido a la limitada dotación de personal y capacidad. El impacto en el hospital regional es fundamental para la atención no relacionada con COVID. El impacto general es moderado.

Mínimo

Otros factores epidemiológicos

Mínimo impacto en la comunidad. Se han suspendido las investigaciones y el rastreo de contratos.

NIVEL DE RIESGO

MÉTRICAS MONITOREADAS

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

MÍNIMO

1. CASOS NUEVOS DIARIOS 1 POR 10,000 POBLACIÓN (PROMEDIO EN 14 DÍAS)
2. COVID-19 PORCENTAJE DE RESULTADOS POSITIVOS 5%
3. CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA EL CUIDADO ES NORMAL

Al nivel mínimo, el riesgo de la propagación del COVID-19 en la comunidad es bajo.

SIN IMPORTAR EL NIVEL DE RIESGO DURANTE TODA LA PANDEMIA, SE LE PIDE A TODOS QUE HAGAN LO SIGUIENTE:

- Permanecer en la casa si está enfermo
- Vacúnese
- Si no se ha vacunado, mantenga una distancia física de 6 pies (cuando esté con personas que no son parte de su familia inmediata)
- Si no se ha vacunado, evite multitudes y lugares con poca ventilación
- Si no se ha vacunado, use una mascarilla en público (especialmente en lugares cerrados) que cubra completamente su nariz y boca en aquellos casos que la distancia física de 6 pies no es posible.
- Lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos o use desinfectante de manos en caso que jabón y agua no estén disponibles
- Población vulnerable (adultos mayores, individuos con ciertas condiciones de salud) tome más precauciones
- Monitoree su salud de manera cuidadosa – esté alerta por síntomas

[Haga clic para el Plan Regional de Nivel de Riesgo COVID-19](#)

MÍNIMO
RIESGO

QUÉ SE DEBE SABER ACERCA DE LOS NIVELES DE RIESGO DE COVID-19 DEL SCPHD:

- Los niveles de riesgo podrían ser aplicados al nivel del condado.
- **Diferentes Condados dentro del SCPHD podrían estar a diferentes niveles de riesgo.** Los niveles de riesgo pueden aumentar o disminuir.
- En TODOS los niveles de riesgo, se deberían seguir las medidas preventivas señaladas en el Nivel de Riesgo Mínimo. *Siempre prepararse para el siguiente nivel de riesgo.*
- Además de métricas que determinan el riesgo de transmisión, oficiales de la salud pública monitorearán muy de cerca y pudieran tomar en consideración lo siguiente para mover a un nivel de riesgo diferente:
 - Información de hospitales asociados – la capacidad hospitalaria local es determinada por cada hospital en la región
 - Tendencias en los exámenes de COVID-19, incluyendo la tasa de exámenes positivos
 - Suministro de Equipo Protectivo Personal (PPE) para proveedores del cuidado de la salud/personal de respuesta inmediata
 - Investigación epidemiológica y capacidad de seguimiento de contacto, incluyendo brotes asociados con viviendas comunitarias
 - Hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID-19
 - Vigilancia sindrómica de las visitas al servicio de emergencia con síntomas de COVID-19